

ネクサパール錠(肝細胞がん) 副作用収集状況一覧(速報)

特定使用成績調査期間中(報告期間は下記参照)に報告された副作用収集状況を以下に示します。

なお、本情報は、医療機関から報告された情報を1週間毎に集計した内容のため、調査により新たな追加情報が得られた場合には、内容が変更になることがあります。

収集期間:平成20年2月25日～平成21年9月22日

		重篤	非重篤	合計
表中の器官別大分類の数字は症例数を、副作用名の数字は発現件数を表示しております。		235	642	877
		395	1654	2049
器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
感染症および寄生虫症		7	4	11
	肝膿瘍	2		2
	膿胸	2		2
	気管支炎	1		1
	敗血症	1		1
	敗血症性ショック	1		1
	肛門膿瘍	1		1
	細菌性胃腸炎		1	1
	爪囲炎		1	1
	肺炎		1	1
	扁桃炎		1	1
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む)		13	3	16
	肝の悪性新生物	7	1	8
	腫瘍出血	3		3
	肝癌破裂	2		2
	肺転移	2		2
	骨転移	1		1
	癌疼痛		1	1
	腫瘍性塞栓症		1	1
血液およびリンパ系障害		9	4	13
	貧血	5	3	8
	播種性血管内凝固	2		2
	汎血球減少症	1	1	2
	血小板減少症	1		1
免疫系障害			1	1
	過敏症		1	1
内分泌障害			1	1
	甲状腺機能低下症		1	1
代謝および栄養障害		21	87	108
	食欲不振	8	63	71
	低リン酸血症	5	14	19
	低ナトリウム血症	4		4
	食欲減退	1	14	15
	低血糖症	1	1	2
	高アンモニア血症	1		1
	高尿酸血症	1		1
	腫瘍崩壊症候群	1		1
	低アルブミン血症		3	3
	高アミラーゼ血症		2	2
	高リパーゼ血症		1	1
	脱水		1	1
	低マグネシウム血症		1	1
	電解質失調		1	1
精神障害		1	1	2
	神経症	1		1
	うつ病		1	1
神経系障害		25	18	43

注1: 副作用名はMedDRA/J(国際医薬用語集)Version12.0の基本語(PT)で記載しています。

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	肝性脳症	17		17
	肝性昏睡	2		2
	頭痛	1	5	6
	感覚鈍麻	1	4	5
	浮動性めまい	1	4	5
	代謝性脳症	1		1
	脳出血	1		1
	脳症	1		1
	味覚異常		3	3
	錯感覚		1	1
	神経学的症状		1	1
	鎮静		1	1
眼障害		1	1	2
	角膜出血	1		1
	結膜炎		1	1
心臓障害		5	2	7
	心不全	3		3
	不整脈	1	1	2
	洞性徐脈	1		1
	心房細動		1	1
血管障害		8	138	146
	高血圧	3	136	139
	出血	3		3
	静脈瘤破裂	2		2
	潮紅		2	2
	ほてり		1	1
	創傷出血		1	1
呼吸器、胸郭および縦隔障害		13	36	49
	間質性肺疾患	3		3
	喀血	2	2	4
	喘息	2		2
	呼吸困難	1	4	5
	胸水	1	1	2
	気胸	1		1
	急性呼吸窮迫症候群	1		1
	呼吸不全	1		1
	肺出血	1		1
	肺障害	1		1
	発声障害		22	22
	咳嗽		6	6
	鼻出血		3	3
	しゃっくり		1	1
	湿性咳嗽		1	1
	上気道の炎症		1	1
胃腸障害		47	175	222
	メレナ	9	1	10
	下痢	7	122	129
	胃腸出血	7		7
	膵炎	3		3
	腹痛	2	7	9
	腹水	2	2	4
	出血性胃潰瘍	2		2
	食道静脈瘤出血	2		2
	吐血	2		2
	変色便	2		2
	口内炎	1	26	27
	上腹部痛	1	3	4

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	胃腸毛細血管拡張症	1	1	2
	胃出血	1		1
	胃静脈瘤出血	1		1
	下部消化管出血	1		1
	血性腹水	1		1
	血便排泄	1		1
	出血性十二指腸潰瘍	1		1
	消化管穿孔	1		1
	上部消化管出血	1		1
	食道静脈瘤	1		1
	大腸穿孔	1		1
	腹腔動脈血栓	1		1
	麻痺性イレウス	1		1
	肛門出血	1		1
	悪心		15	15
	嘔吐		10	10
	口唇炎		4	4
	口の錯感覚		3	3
	口腔内痛		2	2
	舌痛		2	2
	便秘		2	2
	胃潰瘍		1	1
	口腔障害		1	1
	口腔内出血		1	1
	歯肉出血		1	1
	歯肉痛		1	1
	痔出血		1	1
	十二指腸潰瘍		1	1
	頬粘膜のあれ		1	1
肝胆道系障害		52	68	120
	肝機能異常	32	48	80
	肝障害	12	15	27
	肝不全	5		5
	黄疸	4	9	13
	劇症肝炎	1		1
	胆汁うっ滞性黄疸	1		1
	胆管炎		1	1
皮膚および皮下組織障害		64	470	534
	手掌・足底発赤知覚不全症候群	27	392	419
	多形紅斑	27		27
	発疹	8	120	128
	全身性皮疹	2	6	8
	薬疹	2	1	3
	水疱	1	2	3
	スティーブンス・ジョンソン症候群	1		1
	皮下出血	1		1
	脱毛症		51	51
	紅斑		12	12
	湿疹		6	6
	そう痒症		5	5
	蕁麻疹		3	3
	結節性紅斑		1	1
	全身紅斑		1	1
	多汗症		1	1
	皮膚びらん		1	1
	皮膚炎		1	1
	皮膚剥脱		1	1

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集) Version12.0の
基本語(PT)で記載しています。

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	皮膚反応		1	1
	皮膚肥厚		1	1
筋骨格系および結合組織障害		7	11	18
	背部痛	3	1	4
	横紋筋融解	3		3
	筋力低下	1	1	2
	四肢痛		3	3
	筋骨格痛		2	2
	頸部痛		2	2
	関節痛		1	1
	筋痙縮		1	1
腎および尿路障害		10	10	20
	腎不全	4		4
	腎機能障害	3	4	7
	急性腎不全	2		2
	腎出血	1		1
	頻尿		3	3
	血尿		1	1
	腎障害		1	1
	排尿困難		1	1
生殖系および乳房障害			7	7
	陰囊潰瘍		2	2
	陰部そう痒症		1	1
	女性化乳房		1	1
	性器びらん		1	1
	乳頭痛		1	1
	膣出血		1	1
全身障害および投与局所様態		24	133	157
	発熱	18	61	79
	倦怠感	6	35	41
	疲労	2	25	27
	胸痛	1	2	3
	疼痛	1	2	3
	高熱	1	1	2
	全身健康状態低下	1		1
	足のもつれ	1		1
	多臓器不全	1		1
	末梢性浮腫		5	5
	浮腫		4	4
	顔面浮腫		3	3
	胸部不快感		2	2
	圧迫感		1	1
	易刺激性		1	1
	治癒不良		1	1
	粘膜出血		1	1
	無力症		1	1
	有害事象なし		1	1
臨床検査		37	167	204
	血小板数減少	11	63	74
	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	7	26	33
	血中ビリルビン増加	7	25	32
	白血球数減少	5	8	13
	C - 反応性蛋白増加	5	7	12
	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	4	22	26
	血中乳酸脱水素酵素増加	2	9	11
	血中アルブミン減少	2	6	8
	ヘモグロビン減少	2	2	4

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	血圧上昇	1	6	7
	肝機能検査異常	1	5	6
	トランスアミナーゼ上昇	1	4	5
	好中球数減少	1	4	5
	腓酵素増加	1	3	4
	血中カリウム増加	1	2	3
	血中クレアチニン増加	1	1	2
	血中尿酸増加	1	1	2
	血中尿素増加	1	1	2
	アンモニア異常	1		1
	ヘマトクリット減少	1		1
	血中ナトリウム減少	1		1
	赤血球数減少	1		1
	抱合ビリルビン増加	1		1
	血中アミラーゼ増加		30	30
	リパーゼ増加		18	18
	- グルタミルトランスフェラーゼ増加		5	5
	血中アルカリホスファターゼ増加		4	4
	アンモニア増加		3	3
	体重減少		3	3
	肝酵素上昇		2	2
	血中リン減少		2	2
	好酸球数増加		2	2
	尿蛋白		2	2
	血球数異常		1	1
	血中アルブミン増加		1	1
	血中クレアチンホスホキナーゼ増加		1	1
	血中クロール増加		1	1
	血中非抱合ビリルビン増加		1	1
	好中球百分率増加		1	1
	尿中血陽性		1	1
	白血球数増加		1	1
	杆状核好中球百分率増加		1	1
傷害、中毒および処置合併症		1		1
	転倒・転落	1		1