

ネクサパール錠(肝細胞がん) 副作用収集状況一覧(速報)

特定使用成績調査期間中(報告期間は下記参照)に報告された副作用収集状況を以下に示します。

なお、本情報は、医療機関から報告された情報を1週間毎に集計した内容のため、調査により新たな追加情報が得られた場合には、内容が変更になることがあります。

収集期間:平成20年2月25日～平成21年7月14日

		重篤	非重篤	合計
表中の器官別大分類の数字は症例数を、副作用名の数字は発現件数を表示しております。		57	203	260
		91	416	507
器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
感染症および寄生虫症		2	1	3
	肝膿瘍	1		1
	敗血症	1		1
	肺炎		1	1
血液およびリンパ系障害		2		2
	播種性血管内凝固	1		1
	貧血	1		1
内分泌障害			1	1
	甲状腺機能低下症		1	1
代謝および栄養障害		5	21	26
	低リン酸血症	3		3
	食欲不振	2	18	20
	食欲減退		2	2
	高アミラーゼ血症		1	1
	低アルブミン血症		1	1
	低マグネシウム血症		1	1
神経系障害		9	2	11
	肝性脳症	5		5
	意識変容状態	1		1
	肝性昏睡	1		1
	代謝性脳症	1		1
	脳出血	1		1
	浮動性めまい	1		1
	感覚鈍麻		2	2
心臓障害			1	1
	心房細動		1	1
血管障害		1	48	49
	出血	1		1
	高血圧		48	48
	潮紅		1	1
呼吸器、胸郭および縦隔障害		4	9	13
	間質性肺疾患	1		1
	急性呼吸窮迫症候群	1		1
	肺出血	1		1
	肺障害	1		1
	閉塞性気道障害	1		1
	発声障害		6	6
	咳嗽		2	2
	胸水		1	1
	呼吸困難		1	1
胃腸障害		10	47	57
	下痢	3	36	39
	胃腸出血	2		2
	メレナ	1	1	2
	出血性十二指腸潰瘍	1		1
	上部消化管出血	1		1
	上腹部痛	1		1

注1: 副作用名はMedDRA/J(国際医薬用語集)Version12.0の基本語(PT)で記載しています。

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	変色便	1		1
	口内炎		3	3
	腹痛		3	3
	悪心		2	2
	胃腸毛細血管拡張症		1	1
	口の錯感覚		1	1
	口腔障害		1	1
	口唇炎		1	1
	十二指腸潰瘍		1	1
	嘔吐		1	1
肝胆道系障害		14	12	26
	肝機能異常	7	3	10
	肝障害	6	8	14
	黄疸	2	1	3
皮膚および皮下組織障害		17	133	150
	多形紅斑	9		9
	手掌・足底発赤知覚不全症候群	6	107	113
	発疹	2	28	30
	水疱	1		1
	脱毛症		9	9
	紅斑		4	4
	蕁麻疹		3	3
	結節性紅斑		1	1
	皮膚障害		1	1
	皮膚剥脱		1	1
	皮膚肥厚		1	1
筋骨格系および結合組織障害		1	2	3
	横紋筋融解	1		1
	筋痙縮		1	1
	頸部痛		1	1
腎および尿路障害		2		2
	血尿	1		1
	腎不全	1		1
生殖系および乳房障害			1	1
	性器びらん		1	1
全身障害および投与局所様態		8	41	49
	発熱	7	19	26
	疲労	2	10	12
	倦怠感	2	8	10
	死亡	1		1
	圧迫感		1	1
	顔面浮腫		1	1
	胸部不快感		1	1
	高熱		1	1
	浮腫		1	1
	歩行障害		1	1
臨床検査		6	46	52
	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	3	10	13
	血中ビリルビン増加	1	10	11
	血小板数減少	1	7	8
	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1	6	7
	血中乳酸脱水素酵素増加	1	3	4
	血中尿素増加	1		1
	血中アミラーゼ増加		6	6
	リパーゼ増加		4	4
	白血球数減少		3	3
	血圧上昇		2	2

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	好中球数減少		2	2
	C - 反応性蛋白増加		1	1
	トランスアミナーゼ上昇		1	1
	ヘモグロビン減少		1	1
	肝機能検査異常		1	1
	血球数異常		1	1
	血中アルブミン減少		1	1
	血中クレアチニン増加		1	1
	血中非抱合ビリルビン増加		1	1
	体重減少		1	1
	尿蛋白		1	1
	尿中血陽性		1	1
	白血球数増加		1	1