

ネクサパール錠(肝細胞がん) 副作用収集状況一覧(速報)

特定使用成績調査期間中(報告期間は下記参照)に報告された副作用収集状況を以下に示します。

なお、本情報は、医療機関から報告された情報を1週間毎に集計した内容のため、調査により新たな追加情報が得られた場合には、内容が変更になることがあります。

収集期間:平成20年2月25日～平成21年7月21日

		重篤	非重篤	合計
表中の器官別大分類の数字は症例数を、副作用名の数字は発現件数を表示しております。		64	223	287
		101	461	562
器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
感染症および寄生虫症		2	1	3
	肝膿瘍	1		1
	敗血症	1		1
	肺炎		1	1
血液およびリンパ系障害		3		3
	播種性血管内凝固	1		1
	汎血球減少症	1		1
	貧血	1		1
内分泌障害			1	1
	甲状腺機能低下症		1	1
代謝および栄養障害		5	23	28
	低リン酸血症	3	1	4
	食欲不振	2	20	22
	食欲減退		2	2
	高アマラーゼ血症		1	1
	低アルブミン血症		1	1
	低マグネシウム血症		1	1
神経系障害		9	4	13
	肝性脳症	5		5
	浮動性めまい	1	1	2
	意識変容状態	1		1
	肝性昏睡	1		1
	代謝性脳症	1		1
	脳出血	1		1
	感覚鈍麻		2	2
	頭痛		1	1
心臓障害			1	1
	心房細動		1	1
血管障害		1	48	49
	出血	1		1
	高血圧		48	48
	潮紅		1	1
呼吸器、胸郭および縦隔障害		2	11	13
	間質性肺疾患	1		1
	肺出血	1		1
	発声障害		6	6
	咳嗽		3	3
	胸水		1	1
	呼吸困難		1	1
	喀血		1	1
胃腸障害		13	51	64
	下痢	4	38	42
	胃腸出血	3		3
	メレナ	1	1	2
	胃出血	1		1
	出血性十二指腸潰瘍	1		1
	上部消化管出血	1		1

注1: 副作用名はMedDRA/J(国際医薬用語集)Version12.0の基本語(PT)で記載しています。

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	上腹部痛	1		1
	変色便	1		1
	口内炎		4	4
	腹痛		3	3
	悪心		2	2
	胃腸毛細血管拡張症		1	1
	口の錯感覚		1	1
	口腔障害		1	1
	口唇炎		1	1
	十二指腸潰瘍		1	1
	舌痛		1	1
	嘔吐		1	1
肝胆道系障害		17	12	29
	肝機能異常	9	3	12
	肝障害	7	8	15
	黄疸	2	1	3
皮膚および皮下組織障害		20	151	171
	多形紅斑	11		11
	手掌・足底発赤知覚不全症候群	7	125	132
	発疹	2	29	31
	水疱	1		1
	脱毛症		9	9
	紅斑		4	4
	蕁麻疹		3	3
	結節性紅斑		1	1
	皮膚障害		1	1
	皮膚剥脱		1	1
	皮膚肥厚		1	1
筋骨格系および結合組織障害		1	3	4
	横紋筋融解	1		1
	筋骨格痛		1	1
	筋痙縮		1	1
	頸部痛		1	1
腎および尿路障害		2	1	3
	腎障害	1		1
	腎不全	1		1
	血尿		1	1
生殖系および乳房障害			3	3
	陰部そう痒症		1	1
	性器びらん		1	1
	乳頭痛		1	1
全身障害および投与局所様態		9	43	52
	発熱	7	20	27
	疲労	2	10	12
	倦怠感	2	9	11
	死亡	1		1
	顔面浮腫		2	2
	圧迫感		1	1
	胸部不快感		1	1
	高熱		1	1
	浮腫		1	1
	歩行障害		1	1
臨床検査		8	48	56
	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	3	10	13
	血小板数減少	2	10	12
	白血球数減少	2	3	5
	血中ビリルビン増加	1	11	12

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1	6	7
	血中乳酸脱水素酵素増加	1	3	4
	血中尿素増加	1		1
	血中アミラーゼ増加		6	6
	リパーゼ増加		4	4
	C - 反応性蛋白増加		3	3
	血圧上昇		2	2
	血中アルブミン減少		2	2
	好中球数減少		2	2
	トランスアミナーゼ上昇		1	1
	ヘモグロビン減少		1	1
	肝機能検査異常		1	1
	血球数異常		1	1
	血中クレアチニン増加		1	1
	血中非抱合ビリルビン増加		1	1
	好中球百分率増加		1	1
	体重減少		1	1
	尿蛋白		1	1
	尿中血陽性		1	1
	杆状核好中球百分率増加		1	1