

ネクサパール錠(肝細胞がん) 副作用収集状況一覧(速報)

特定使用成績調査期間中(報告期間は下記参照)に報告された副作用収集状況を以下に示します。

なお、本情報は、医療機関から報告された情報を1週間毎に集計した内容のため、調査により新たな追加情報が得られた場合には、内容が変更になることがあります。

収集期間:平成20年2月25日～平成21年8月18日

		重篤	非重篤	合計	
表中の器官別大分類の数字は症例数を、副作用名の数字は発現件数を表示しております。		副作用例数	149	401	550
		副作用件数	262	960	1222
器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計	
感染症および寄生虫症		6	2	8	
	肝膿瘍	2		2	
	気管支炎	1		1	
	細菌性肺炎	1		1	
	膿胸	1		1	
	敗血症	1		1	
	敗血症性ショック	1		1	
	爪囲炎		1	1	
	肺炎		1	1	
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む)		5	1	6	
	肝の悪性新生物	4	1	5	
	腫瘍出血	1		1	
血液およびリンパ系障害		8	3	11	
	貧血	4	2	6	
	播種性血管内凝固	2		2	
	汎血球減少症	1	1	2	
	血小板減少症	1		1	
内分泌障害			1	1	
	甲状腺機能低下症		1	1	
代謝および栄養障害		11	49	60	
	食欲不振	5	37	42	
	低ナトリウム血症	4		4	
	低リン酸血症	3	8	11	
	食欲減退		6	6	
	高アマラーゼ血症		1	1	
	高リパーゼ血症		1	1	
	低アルブミン血症		1	1	
	低マグネシウム血症		1	1	
	低血糖症		1	1	
精神障害		1		1	
	神経症	1		1	
神経系障害		15	7	22	
	肝性脳症	9		9	
	浮動性めまい	1	3	4	
	頭痛	1	2	3	
	肝性昏睡	1		1	
	代謝性脳症	1		1	
	脳出血	1		1	
	脳症	1		1	
	感覚鈍麻		2	2	
眼障害		1		1	
	角膜出血	1		1	
心臓障害		4	1	5	
	心不全	2		2	
	洞性徐脈	1		1	
	不整脈	1		1	
	心房細動		1	1	

注1: 副作用名はMedDRA/J(国際医薬用語集)Version12.0の基本語(PT)で記載しています。

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
血管障害		3	90	93
	高血圧	2	88	90
	出血	1		1
	潮紅		2	2
	ほてり		1	1
	創傷出血		1	1
呼吸器、胸郭および縦隔障害		8	23	31
	間質性肺疾患	3		3
	胸水	1	1	2
	喀血	1	1	2
	気胸	1		1
	急性呼吸窮迫症候群	1		1
	肺出血	1		1
	喘息	1		1
	発声障害		15	15
	呼吸困難		3	3
	咳嗽		2	2
	鼻出血		2	2
	湿性咳嗽		1	1
胃腸障害		22	98	120
	胃腸出血	6		6
	下痢	5	65	70
	メレナ	5	1	6
	上腹部痛	1	1	2
	胃出血	1		1
	胃静脈瘤出血	1		1
	血便排泄	1		1
	出血性十二指腸潰瘍	1		1
	上部消化管出血	1		1
	腹腔動脈血栓	1		1
	変色便	1		1
	肛門出血	1		1
	口内炎		11	11
	悪心		8	8
	腹痛		5	5
	嘔吐		4	4
	口の錯感覚		2	2
	口腔内出血		2	2
	口唇炎		2	2
	腹水		2	2
	胃腸毛細血管拡張症		1	1
	胃潰瘍		1	1
	口腔障害		1	1
	口腔内痛		1	1
	歯肉出血		1	1
	痔出血		1	1
	十二指腸潰瘍		1	1
	舌痛		1	1
	便秘		1	1
肝胆道系障害		35	32	67
	肝機能異常	22	18	40
	肝障害	8	10	18
	黄疸	3	6	9
	肝不全	2		2
	肝硬変	1		1
皮膚および皮下組織障害		48	302	350
	多形紅斑	21		21

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集) Version12.0の基本語(PT)で記載しています。

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	手掌・足底発赤知覚不全症候群	20	248	268
	発疹	6	71	77
	紅斑	1	7	8
	水疱	1	1	2
	スティーブンス・ジョンソン症候群	1		1
	薬疹	1		1
	脱毛症		33	33
	そう痒症		4	4
	蕁麻疹		3	3
	全身性皮疹		2	2
	結節性紅斑		1	1
	湿疹		1	1
	全身紅斑		1	1
	多汗症		1	1
	皮膚びらん		1	1
	皮膚剥脱		1	1
	皮膚反応		1	1
	皮膚肥厚		1	1
筋骨格系および結合組織障害		3	6	9
	背部痛	2		2
	横紋筋融解	1		1
	四肢痛		3	3
	筋骨格痛		1	1
	筋痙縮		1	1
	頸部痛		1	1
腎および尿路障害		7	4	11
	腎機能障害	2	2	4
	急性腎不全	2		2
	腎不全	2		2
	腎出血	1		1
	血尿		1	1
	頻尿		1	1
生殖系および乳房障害			5	5
	陰囊潰瘍		1	1
	陰部そう痒症		1	1
	性器びらん		1	1
	乳頭痛		1	1
	膣出血		1	1
全身障害および投与局所様態		17	79	96
	発熱	14	37	51
	倦怠感	4	18	22
	疲労	2	17	19
	高熱	1	1	2
	全身健康状態低下	1		1
	足のもつれ	1		1
	多臓器不全	1		1
	浮腫		3	3
	顔面浮腫		2	2
	胸部不快感		2	2
	圧迫感		1	1
	胸痛		1	1
	歩行障害		1	1
臨床検査		28	95	123
	血小板数減少	8	32	40
	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	7	15	22
	血中ビリルビン増加	6	13	19
	C - 反応性蛋白増加	5	5	10

器官別大分類	副作用名(注1)	重篤	非重篤	合計
	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	4	12	16
	白血球数減少	4	5	9
	肝機能検査異常	2	7	9
	血中乳酸脱水素酵素増加	2	6	8
	ヘモグロビン減少	2	1	3
	トランスアミナーゼ上昇	1	2	3
	血中アルブミン減少	1	2	3
	血中カリウム増加	1	1	2
	血中クレアチニン増加	1	1	2
	血中尿素増加	1	1	2
	アンモニア異常	1		1
	ヘマトクリット減少	1		1
	血中ナトリウム減少	1		1
	血中尿酸増加	1		1
	赤血球数減少	1		1
	血中アミラーゼ増加		16	16
	リパーゼ増加		10	10
	血圧上昇		4	4
	- グルタミルトランスフェラーゼ増加		2	2
	好酸球数増加		2	2
	好中球数減少		2	2
	アンモニア増加		1	1
	肝酵素上昇		1	1
	血球数異常		1	1
	血中クレアチンホスホキナーゼ増加		1	1
	血中クロール増加		1	1
	血中非抱合ビリルビン増加		1	1
	好中球百分率増加		1	1
	体重減少		1	1
	尿蛋白		1	1
	尿中血陽性		1	1
	杆状核好中球百分率増加		1	1
	膵酵素増加		1	1
傷害、中毒および処置合併症		1		1
	転倒・転落	1		1